





月日	/ ()	/ ()	/ ()	/ () ~ / ()
経過	治療前日入院	治療日 (1日目)	2日目	3日目 (退院可) ~ 6日目
内服 注射	<ul style="list-style-type: none"> 内服している薬があれば、看護師に提出して下さい。 	<ul style="list-style-type: none"> 朝 10 時頃より点滴をはじめます。 最初に吐き気止めとステロイド剤を 30 分かけて点滴し、その後抗がん剤を 1 時間点滴し、終了したら抜きます。(開始より約 2 時間位で終了します) 		
検査	<ul style="list-style-type: none"> 必要時採血を行います。 			
食事	<ul style="list-style-type: none"> 常食です。 	<ul style="list-style-type: none"> 吐き気があり食事がとれない場合は内容が変更できます。 		
排泄	<ul style="list-style-type: none"> 自由です。 			
活動 安静度	<ul style="list-style-type: none"> 自由です。 	<ul style="list-style-type: none"> 自由ですが、点滴に気をつけて歩行しましょう。 		
清潔	<ul style="list-style-type: none"> 入浴自由です。 	<ul style="list-style-type: none"> 点滴終了後入浴は自由です。 		
患者様 及び ご家族への 説明	<ul style="list-style-type: none"> 入院時のオリエンテーションがあります。 主治医より治療についての説明があります。 感染予防のため手洗い・うがいに心がけましょう。 アルコールに弱い体質の方は、看護師にお知らせ下さい。 	<ul style="list-style-type: none"> 点滴の入っている部分に痛みなどの異常がある時や吐き気が強い時などは、看護師にお知らせ下さい。 点滴中に「どきどきする」「発疹が出てかゆみがある」「暑くないのに汗をかく」など普段と違うことがあれば、すぐに看護師にお知らせ下さい。 薬剤師より化学療法と薬剤の副作用についての説明があります。 	<ul style="list-style-type: none"> 副作用が現れた時は症状に応じて対処します。(筋肉や関節の痛み・手足のしびれが出現しやすいです) 	<ul style="list-style-type: none"> 退院時に次回診察日について説明します。 うがい・手洗いをを行い、体を清潔に保ち、感染に注意しましょう。 咳が続く・38.0℃以上の発熱がある・食欲低下や口内炎がひどいなどの症状がある時は外来を受診して下さい。 治療の 2～3 週間後から脱毛が起きます。(帽子・かつらなどを利用しましょう。) 