





月日	/ ()	/ ()	/ ()	/ () ~ / ()
経過	治療前日入院	治療日(1日目)	2日目	3日目(退院可)~6日目
内服 注射	<ul style="list-style-type: none"> 内服している薬があれば、看護師に提出して下さい。 	<ul style="list-style-type: none"> 朝10時頃より点滴をはじめます。 最初に吐き気止めとステロイド剤を30分かけて点滴し、その後2種類の抗がん剤を約2時間点滴し、終了したら抜きます。 (開始より約3時間位で終了します。) (機械を使用しながら点滴をします。) 		
検査	<ul style="list-style-type: none"> 必要時採血を行います。 			
食事	<ul style="list-style-type: none"> 常食です。 	<ul style="list-style-type: none"> 吐き気があり食事がとれない場合は食事内容が変更できます。 点滴終了後より予防的に数日間水分を多めにとるように心掛けましょう。 		
排泄	<ul style="list-style-type: none"> 自由です。 			
活動 安静度	<ul style="list-style-type: none"> 自由です。 	<ul style="list-style-type: none"> 自由ですが、点滴に気をつけて歩行しましょう。 		
清潔	<ul style="list-style-type: none"> 入浴自由です。 	<ul style="list-style-type: none"> 点滴終了後入浴は自由です。 		
患者様 及び ご家族への 説明	<ul style="list-style-type: none"> 入院時のオリエンテーションがあります。 主治医より治療についての説明があります。 感染予防のため手洗い・うがいに心がけましょう。 アルコールに弱い体質の方は、看護師にお知らせ下さい。 	<ul style="list-style-type: none"> 点滴の入っている部分に痛みなどの異常がある時や吐き気が強い時などは、看護師にお知らせ下さい。 点滴中に「どきどきする」「発疹が出てかゆみがある」「暑くないのに汗をかく」など普段と違うことがあれば、すぐに看護師にお知らせ下さい。 薬剤師より化学療法と薬剤の副作用についての説明があります。 	<ul style="list-style-type: none"> 副作用が現れた時は症状に応じて対処します。 (嘔気・嘔吐・食欲不振・咳・発熱・排尿障害・血尿・筋肉痛・関節痛・下痢・口内炎・浮腫・手足のしびれ・涙目等の出現の可能性があります。) 退院前日に退院指導があります。 退院時に次回診察日について説明します。 うがい・手洗いをを行い、体を清潔に保ち、感染に注意しましょう。 治療の2~3週間後から脱毛が起きます。 (帽子・かつらなどを利用しましょう。) 