

13. 特定術式における適切な予防的抗菌薬選択率

【分子】： 術式ごとに適切な予防的抗菌薬が選択された手術件数

【分母】： 特定術式の手術件数

特定手術：冠動脈バイパス手術、そのほかの心臓手術、股関節人工骨頭置換術
：膝関節置換術、血管手術、大腸手術、子宮全摘除術

- 除外
1. 入院時年齢が18歳未満の患者
 2. 在院日数が120日以上患者
 3. 帝王切開手術施行患者
 4. 臨床試験・治験を実施している患者
 5. 術前に感染が明記されている患者
 6. 全身/脊髄/硬膜外麻酔で行なわれた手術・手技が、主たる術式の前後3日（主たる術式が冠動脈バイパス手術またはそのほかの心臓手術の場合は4日）に行なわれた（日数計算は麻酔開始日/麻酔終了日を基点とする）
 7. 術後の抗菌薬長期投与の理由が記載されている
 8. 手術室内または回復室内での死亡患者

調査対象月	分母数	分子数	備考	割合
2015年4月	22	22		100.0%
2015年5月	21	20		95.2%
2015年6月	17	17		100.0%
2015年7月	22	22		100.0%
2015年8月	25	25		100.0%
2015年9月	15	15		100.0%
2015年10月	29	29		100.0%
2015年11月	27	27		100.0%
2015年12月	19	19		100.0%
2016年1月	18	18		100.0%
2016年2月	30	30		100.0%
2016年3月	24	23		95.8%